

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)  
(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)  
~~XXXXXXXXXX~~ INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

ABONNEMENT ANNUEL  
25 Francs

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS  
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

Supplément n° 1 au Bulletin N° 89

27 FEVRIER 1968

- 3 -

DLP -6-3-68 757067

INFORMATIONS

CULTURES OLEAGINEUSES

## CHARANCON DES TIGES DU COLZA

Les températures anormalement élevées des 14 et 15 Février ont provoqué une sortie de charançons parfois très importante dans les régions fortement envahies l'année dernière. Il en a été de même le 23 Février où une nouvelle sortie a pu être observée.

Toutefois l'abaissement important des températures qui a rapidement suivi ces journées chaudes a empêché toute activité dangereuse de ces charançons. Tant que les basses températures que nous subissons actuellement persisteront, l'activité de ces ravageurs sera très faible et aucun traitement ne devra être envisagé.

Par contre dès que les températures s'élèveront, il est à craindre une nouvelle sortie importante d'adultes et le dépôt de pontes par les premières femelles qui auront atteint leur maturité sexuelle. Les dégâts seront alors d'autant plus importants que les Colzas seront en cours de montaison.

En conséquence un traitement devra être envisagé dans toutes les régions fortement infestées l'année dernière dès que l'on observera un relèvement sensible des températures.

Dans les régions où les dégâts ont été faibles l'année dernière, seule la présence éventuelle d'adultes dans le bouquet foliaire ou au niveau du sol permettra de juger de l'opportunité du traitement.

## ARBRES FRUITIERS

### CLOQUE DU PECHER

Nous rappelons les indications données dans notre Bulletin Technique de Février 1968.

Les traitements précoces sont les plus efficaces contre cette maladie. Des contaminations sont possibles dès le début du gonflement quand les écailles s'écartent l'extrémité du bourgeon floral est vert pâle, le bourgeon à bois étant sensiblement stationnaire.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles,  
G. RIBAUT  
B. PACQUETEAU

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
G. BENAS